

Chapitre 9 : Equations différentielles

Dans tout le chapitre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou \mathbb{C} et I est un intervalle de \mathbb{R} .

I Equations différentielles linéaire du premier ordre

1.1 Définition

Définition 1

Soient $a, b : I \rightarrow \mathbb{K}$ des fonctions continues sur I .

- On dit que $y : I \rightarrow \mathbb{K}$ est solution de l'équation différentielles linéaire d'ordre un $y' + a(x)y = b(x)$ si et seulement si : y est dérivable sur I et $\forall x \in I, y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$.
- On appelle équation homogène (ou sans second membre) associée à (E) , l'équation :

$$y' + a(x)y = 0 \quad (E_0)$$

1.2 Résolution de l'équation homogène

Proposition 1

Soit $a : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue sur I et $A : I \rightarrow \mathbb{K}$ une primitive de a sur I .

Les solutions sur I de $(E_0) : y' + a(x)y = 0$ sont les fonctions $\begin{matrix} I & \rightarrow & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \lambda e^{-A(x)}, \lambda \in \mathbb{K}. \end{matrix}$

⇔ **Exemple 1** : Résoudre l'équation différentielle :

$$y' + xy = 0.$$

Corollaire 1

Soit $a \in \mathbb{K}$, les solutions sur \mathbb{R} de $y' + ay = 0$ sont les fonctions :

$$\begin{matrix} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \lambda e^{-ax}, \lambda \in \mathbb{K}. \end{matrix}$$

Corollaire 2

Soit $a : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue sur I soient $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$. Il existe une unique solution de l'équation

$y' + a(x)y = 0$ telle que $y(x_0) = y_0$ qui est : $\begin{matrix} I & \rightarrow & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & y_0 e^{-\int_{x_0}^x a(t)dt}. \end{matrix}$

Remarque : Le système constitué de l'équation différentielle et de la condition initiale :

$$\begin{cases} y' + a(x)y = 0 \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

s'appelle un problème de Cauchy.

1.3 Résolution de l'équation avec second membre

Proposition 2

Soient $a, b : I \rightarrow \mathbb{K}$ des fonctions continues sur I .

L'équation $y' + a(x)y = b(x)$ admet au moins une solution.

Proposition 3

Soient $a, b : I \rightarrow \mathbb{K}$ continues sur I et $(E) : y' + a(x)y = b(x)$.

Si y_p est une solution particulière de (E) et si S_0 est l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée à (E) , alors l'ensemble S des solutions de (E) est :

$$S = \{y_p + y_0, y_0 \in S_0\}.$$

Remarque : Les solutions de l'équation avec second membre sont la somme **des** solutions de l'équation homogène et d'**une** solution particulière.

⇨ **Exemple 2 :** Résoudre l'équation différentielle :

$$y' + xy = x.$$

⇨ **Exemple 3 :** Résoudre l'équation différentielle :

$$\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau}.$$

Méthode 1

L'équation différentielle :

$$y' + ay = b \cos(\alpha x) + c \sin(\alpha x),$$

avec $a, b, c, \alpha \in \mathbb{R}$ admet une solution particulière de la forme :

$$x \mapsto A \cos(\alpha x) + B \sin(\alpha x),$$

avec $A, B \in \mathbb{R}$.

⇨ **Exemple 4 :** Résoudre l'équation différentielle :

$$y' - y = -2 \sin x.$$

⇨ **Exemple 5 :** Déterminer les fonctions $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que :

$$\forall x \in [0, 1], f'(x) - f(x) = f(0) + f(1).$$

Proposition 4

Soit (E) l'équation différentielle $y' + a(x)y = b(x)$ où a et b sont continues sur I . Soient $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$. Il existe une unique solution $y : I \rightarrow \mathbb{K}$ de (E) telle que $y(x_0) = y_0$.

1.4 Principe de superposition

Proposition 5 (Principe de superposition)

Soient $a, b : I \rightarrow \mathbb{K}$ des fonctions continues.

On suppose que $b = \sum_{k=1}^n b_k$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et, pour tout $k \in [1, n]$, $b_k : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue.

Soit $k \in [1, n]$, soit y_k une solution sur I de $y' + a(x)y = b_k(x)$.

Alors la fonction $y = \sum_{k=1}^n y_k$ est une solution de $y' + a(x)y = b(x)$.

⇨ **Exemple 6 :** Résoudre l'équation différentielle :

$$y' + 2y = 2 + 3e^x - 4 \sin(2x).$$

1.5 Méthode de la variation de la constante

Méthode 2 : Recherche d'une solution particulière : Méthode de variation de la constante

Soit l'équation différentielle (E) $y' + a(x)y = b(x)$ où a et b sont continues sur I .
Soit A une primitive de a sur I .

- Les solutions sur I de l'équation homogène $(E_0) y' + a(x)y = 0$ sont les fonctions $\begin{matrix} I & \rightarrow & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \lambda e^{-A(x)}, \lambda \in \mathbb{K}. \end{matrix}$
- On cherche une solution particulière de (E) sur I de la forme $\begin{matrix} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \lambda(x)e^{-A(x)} \end{matrix}$ où λ est une fonction dérivable.
On a :

$$\begin{aligned} y' + a(x)y = b(x) &\iff \forall x \in I, \lambda'(x)e^{-A(x)} + \lambda(x)(-A'(x))e^{-A(x)} + a(x)\lambda(x)e^{-A(x)} = b(x) \\ &\iff \forall x \in I, \lambda'(x) = b(x)e^{A(x)} \end{aligned}$$

La détermination d'une solution particulière de (E) se ramène ainsi à la recherche d'une primitive de $x \mapsto b(x)e^{A(x)}$ sur I .

⇨ **Exemple 7 :** Résoudre l'équation différentielle :

$$(1 + x^2)y' - xy = x(1 + x^2).$$

⇨ **Exemple 8 :** Résoudre l'équation différentielle sur \mathbb{R}^{+*} :

$$xy' + y = \cos(x).$$

II Équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants

2.1 Définition

Définition 2

Soient $a, b, c \in \mathbb{K}$, $a \neq 0$ et $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue.

- On dit que y est solution de l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants $ay'' + by' + cy = f(x)$ (E) si et seulement si y est deux fois dérivable et : $\forall x \in I, ay''(x) + by'(x) + cy(x) = f(x)$.
- On appelle équation homogène associée à (E) l'équation : $ay'' + by' + cy = 0$ (E_0).

2.2 Résolution de l'équation homogène

Définition 3

Soit $a, b, c \in \mathbb{K}$, $a \neq 0$ et soit (E_0) l'équation différentielle $ay'' + by' + cy = 0$.
L'équation $ar^2 + br + c = 0$ est appelée **équation caractéristique** de (E_0).

Proposition 6

Soit $a, b, c \in \mathbb{K}$, $a \neq 0$ et soit (E_0) l'équation différentielle $ay'' + by' + cy = 0$.
Soit $r \in \mathbb{C}$. La fonction $x \mapsto e^{rx}$ est solution de (E) sur \mathbb{R} si et seulement si r est solution de l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$.

Lemme 1

Soient $a, b \in \mathbb{K}$, $a \neq 0$. Soit r une racine de l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$. Soit $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ deux fois dérivable. Posons $z : \begin{matrix} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ x & \mapsto & e^{-rx}y(x) \end{matrix}$. On a : $ay'' + by' + cy = 0$ ssi $az'' + (2ar + b)z' = 0$.

Théorème 1

Soit $a, b, c \in \mathbb{K}$, $a \neq 0$ et $(E_0) : ay'' + by' + cy = 0$.

Si $b^2 - 4ac = 0$ alors l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ admet une racine double $r_0 \in \mathbb{K}$.

Les solutions de (E_0) sont alors les fonctions :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{K} \\ x &\mapsto (\lambda x + \mu)e^{r_0 x} \quad \text{avec } \lambda, \mu \in \mathbb{K}. \end{aligned}$$

⇨ **Exemple 9 :** Résoudre l'équation différentielle :

$$y'' - 2y' + y = 0.$$

Théorème 2

Soit $a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$ et $(E_0) : ay'' + by' + cy = 0$.

Si $b^2 - 4ac \neq 0$ alors l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ admet deux racines r_1 et r_2 dans \mathbb{C} .

Les solutions de (E_0) sont alors les fonctions :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{C} \\ x &\mapsto \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{r_2 x} \quad \text{avec } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}. \end{aligned}$$

⇨ **Exemple 10 :** Résoudre l'équation différentielle :

$$y'' - 2iy' - 2y = 0.$$

Théorème 3

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ et $(E_0) : ay'' + by' + cy = 0$.

Si $b^2 - 4ac > 0$ alors l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ admet deux racines r_1 et r_2 dans \mathbb{R} .

Les solutions de (E_0) sont alors les fonctions :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{r_2 x} \quad \text{avec } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

⇨ **Exemple 11 :** Résoudre l'équation différentielle :

$$y'' - 4y' + 3y = 0.$$

Théorème 4

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ et $(E_0) : ay'' + by' + cy = 0$.

Si $b^2 - 4ac < 0$ alors l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ admet deux racines complexes conjuguées non réelles $\alpha \pm i\beta$, (avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$).

Les solutions de (E_0) sont alors les fonctions :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto (\lambda \cos(\beta x) + \mu \sin(\beta x))e^{\alpha x} \quad \text{avec } \lambda, \mu \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

⇨ **Exemple 12 :** Résoudre l'équation différentielle :

$$y'' + 2y' + 2y = 0.$$

⇨ **Exemple 13 :** Résoudre l'équation différentielle suivante sur \mathbb{R}^{+*} :

$$x^2 y'' + y = 0.$$

On pourra poser $t = \ln x$.

⇨ **Exemple 14 :** Résoudre l'équation différentielle suivante sur \mathbb{R} :

$$y'' + 4xy' + (3 + 4x^2)y = 0.$$

On pourra poser $z = e^{x^2} y$.

2.3 Résolution de l'équation avec second membre

Proposition 7

Soient $a, b, c \in \mathbb{K}$, $a \neq 0$, soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue.
L'équation $ay'' + by' + cy = f(x)$ admet au moins une solution.

Proposition 8

Soient $a, b, c \in \mathbb{K}$, $a \neq 0$, soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue.

Soit $(E) : ay'' + by' + cy = f(x)$.

Si y_p est une solution particulière de (E) et si S_0 est l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée à (E) , alors l'ensemble S des solutions de (E) est :

$$S = \{y_p + y_0, y_0 \in S_0\}.$$

Méthode 3 : Recherche d'une solution particulière

- L'équation différentielle $ay'' + by' + cy = Ae^{\lambda x}$ (E) où $a, b, c, A, \lambda \in \mathbb{K}$ admet une solution de la forme :
 - $x \mapsto Be^{\lambda x}$ si λ n'est pas solution de l'équation caractéristique;
 - $x \mapsto Bxe^{\lambda x}$ si λ est racine simple de l'équation caractéristique;
 - $x \mapsto Bx^2e^{\lambda x}$ si λ est racine double de l'équation caractéristique;

où $B \in \mathbb{K}$.

- L'équation différentielle $ay'' + by' + cy = A_1 \cos(\beta x) + A_2 \sin(\beta x)$ (E) où $a, b, c, A_1, A_2 \in \mathbb{R}$ avec $\beta \in \mathbb{R}^*$ admet une solution de la forme :

- $x \mapsto B_1 \cos(\beta x) + B_2 \sin(\beta x)$ si $i\beta$ n'est pas solution de l'équation caractéristique;
- $x \mapsto B_1 x \cos(\beta x) + B_2 x \sin(\beta x)$ si $i\beta$ est racine simple de l'équation caractéristique.

où $B_1, B_2 \in \mathbb{R}$.

⇨ **Exemple 15 :** Résoudre l'équation différentielle :

$$-3y'' - 2y' + y = \cos(x).$$

2.4 Principe de superposition

Proposition 9 : Principe de superposition

Soient $a, b, c \in \mathbb{K}$, $a \neq 0$, soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue. On suppose que $f = \sum_{k=1}^n f_k$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$f_k : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue.

Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, soit y_k une solution sur I de $ay'' + by' + cy = f_k(x)$.

Alors la fonction $y = \sum_{k=1}^n y_k$ est une solution de $ay'' + by' + cy = f(x)$.

⇨ **Exemple 16 :** Résoudre l'équation différentielle :

$$y'' - 3y' + 2y = e^{-x} + e^{2x}.$$

2.5 Problème de Cauchy

Proposition 10

Soit (E) l'équation différentielle $ay'' + by' + cy = f(x)$ où $a, b, c \in \mathbb{K}$, $a \neq 0$, et f continue sur I .

Soient $x_0 \in I$ et $y_0, y'_0 \in \mathbb{K}$.

Il existe une unique solution $y : I \rightarrow \mathbb{K}$ de (E) telle que $\begin{cases} y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y'_0 \end{cases}$.

Remarque : Comme l'équation différentielle est d'ordre 2, la condition initiale doit être double pour avoir l'unicité de la solution.