

Cours :**• Chapitre 9 : Equations différentielles**

I Equations différentielles linéaires du premier ordre

II Equations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants

• Chapitre 10 : Ensembles et applications

I Ensembles

Questions de cours et exercices type :

Q₁ : Résolution de $y' + a(x)y = 0$ sans et avec condition initiale (*ch 9, proposition 1 et corollaire 2*)

Q₂ : Ensemble des solutions de $ay'' + by' + cy = 0$ avec $a, b, c \in \mathbb{C}$ dans le cas où l'équation caractéristique a deux racines distinctes (*ch 9, théorème 2*)

T₁ : *Ch 9, exemple 8*

Résoudre l'équation différentielle sur \mathbb{R}^{+*} :

$$xy' + y = \cos(x).$$

T₂ : *Ch 9, exemple 13*

Résoudre l'équation différentielle suivante sur \mathbb{R}^{+*} :

$$x^2 y'' + y = 0.$$

On pourra poser $t = \ln x$.

T₃ : *Ch 10, exemple 5*

Soit E un ensemble, soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$. Résoudre l'équation d'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$ l'équation :

$$X \cup A = B.$$

Cours :**• Chapitre 9 : Equations différentielles**

I Equations différentielles linéaires du premier ordre

II Equations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants

• Chapitre 10 : Ensembles et applications

I Ensembles

Questions de cours et exercices type :

Q₁ : Résolution de $y' + a(x)y = 0$ sans et avec condition initiale (*ch 9, proposition 1 et corollaire 2*)

Q₂ : Ensemble des solutions de $ay'' + by' + cy = 0$ avec $a, b, c \in \mathbb{C}$ dans le cas où l'équation caractéristique a deux racines distinctes (*ch 9, théorème 2*)

T₁ : *Ch 9, exemple 8*

Résoudre l'équation différentielle sur \mathbb{R}^{+*} :

$$xy' + y = \cos(x).$$

T₂ : *Ch 9, exemple 13*

Résoudre l'équation différentielle suivante sur \mathbb{R}^{+*} :

$$x^2 y'' + y = 0.$$

On pourra poser $t = \ln x$.

T₃ : *Ch 10, exemple 5*

Soit E un ensemble, soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$. Résoudre l'équation d'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$ l'équation :

$$X \cup A = B.$$