

Exercices du chapitre 6 : Calcul algébrique

I Sommes

Exercice 1 :

Soit $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres complexes telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n x_k = n(n+2).$$

Soit $n \in \mathbb{N}$, déterminer les valeurs de :

1. $S_1 = \sum_{k=0}^6 x_k,$
2. $S_2 = \sum_{k=0}^{n+1} x_k,$
3. $S_3 = \sum_{k=0}^{2n} x_k,$
4. $S_4 = \sum_{k=0}^n 2x_k,$
5. $S_5 = \sum_{k=n+1}^{2n} x_k.$

Exercice 2 : (★)

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer :

$$\sum_{k=0}^{2n} (-1)^k k.$$

Exercice 3 : (★)

Soit $N \in \mathbb{N}^*$. Calculer :

$$\sum_{n=0}^N n^3.$$

Exercice 4 :

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer :

$$\sum_{q=0}^n \sum_{p=0}^q \sum_{k=0}^p 2^k.$$

Exercice 5 : (★)

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n 2^{\min(i,j)} = 6 \cdot 2^n - 2n - 5.$$

Exercice 6 : (★★)

Soit $n \geq 2$.

a. Simplifier l'expression :

$$\sum_{p=1}^n \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+1} \right).$$

b. Utiliser une méthode analogue pour en déduire une expression plus simple de :

$$\sum_{p=1}^n \frac{2p+1}{(p^2+p)^2}.$$

Exercice 7 : (★)

1. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

2. On pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

Etudier la convergence de $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Exercice 8 : (★★) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor \text{ et } \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = \lfloor nx \rfloor.$$

Exercice 9 : (★★)

Montrer que si la suite (u_n) est monotone, alors la suite de terme général :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k,$$

est monotone de même sens que (u_n) .

Exercice 10 :

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R} \left| \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k \sin(kx)}{n+k^2} \right| \leq 1.$$

Exercice 11 : (★★)

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \left| \sum_{k=1}^n (-1)^k \left(\sin \frac{\pi}{6k} \right)^k \right| \leq 1.$$

II Produits**Exercice 12 :** Soit $n \in \mathbb{N}$, calculer :

$$\prod_{k=0}^n 2^k.$$

Exercice 13 : (★)

Montrer que :

- a. $\forall n \in \mathbb{N}^*, (n+1)! \geq \sum_{k=1}^n k!$,
 b. $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n k.k! = (n+1)! - 1.$

Exercice 14 : (★)

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 2^{n-1} \leq n! \leq n^n.$$

Exercice 15 : (★)

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \prod_{k=1}^n (4k-2) = \prod_{k=n+1}^{2n} k.$$

Exercice 16 : (★★)Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de nombres réels strictement positifs.

On définit la suite des moyennes arithmétiques par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, A_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k.$$

On définit la suite des moyennes géométriques par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, G_n = \left(\prod_{k=1}^n u_k \right)^{\frac{1}{n}}.$$

Le but de cet exercice est de montrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, G_n \leq A_n.$$

1. Montrer que :

$$\forall x > 0, \ln(x) \leq x - 1.$$

2. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \ln \left(\prod_{k=1}^n u_k \right) = \sum_{k=1}^n \ln(u_k)$$

3. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, G_n \leq A_n.$$

4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Dans quel cas a-t-on $A_n = G_n$?**Exercice 17 : (★★)** Soit $n \geq 2$. Simplifier l'expression :

$$\prod_{p=1}^n \frac{(2p+1)(2p-1)}{(2p+3)(2p+5)}.$$

Exercice 18 : (★★) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soient $a_1, \dots, a_n \in [1, +\infty[$. Montrer que :

$$\prod_{i=1}^n (1 + a_i) \leq 2^{n-1} \left(1 + \prod_{i=1}^n a_i \right).$$

Exercice 19 : (★★)1. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$\operatorname{ch} x = \frac{\operatorname{sh} 2x}{2 \operatorname{sh} x}.$$

2. Simplifier :

$$u_n = \prod_{k=1}^n \operatorname{ch} \frac{x}{2^k}.$$

3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

III Sommes doubles

Exercice 20 : 

Soit $n \in \mathbb{N}$, calculer :

$$\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n 2^{2i-j}.$$

Exercice 21 : 

Soit $n \in \mathbb{N}$, vérifier que :

$$\sum_{k=1}^n k 2^k = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^k 2^k,$$

et en déduire la valeur de :

$$\sum_{k=1}^n k 2^k.$$

Exercice 22 : (★★)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer :

$$\sum_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket} \max(i, j),$$

où $\max(i, j)$ désigne le maximum de i et j , c'est-à-dire : $\max(i, j) = j$ si $i \leq j$ et $\max(i, j) = i$ sinon.

IV Coefficients binomiaux et formule du binôme de Newton

Exercice 23 : (★)

Déterminer tous les $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ avec $p < n$ tels que :

$$\begin{cases} \binom{n}{p} = \binom{n}{p+1} \\ 4 \binom{n}{p} = 5 \binom{n}{p-1} \end{cases}$$

Exercice 24 : 

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer :

$$\sum_{k=0}^{n-1} (k+1) \frac{\binom{n}{k+1}}{\binom{n}{k}}.$$

Exercice 25 : (★★)

On considère la suite définie par :

$$S_0 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, S_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} S_k.$$

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_n \leq n!.$$

Exercice 26 : (★)

Soient $n, p, q \in \mathbb{N}$ tels que $p \geq nq + 1$. Montrer que :

$$\sum_{k=0}^n \binom{p-k}{q} = \binom{p+1}{q+1} - \binom{p-n}{q+1}.$$

Exercice 27 : 

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer :

$$\sum_{k=0}^n \frac{\binom{n}{k}}{k+1}.$$

Exercice 28 : 

Soit $n \in \mathbb{N}$, calculer :

$$\sum_{k=0}^n \sum_{i=k}^n \binom{n}{i} \binom{i}{k}.$$

Exercice 29 : (★★)

Soient $a, b \in \mathbb{R}^{+*}$. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \left(1 + \frac{a}{b}\right)^n + \left(1 + \frac{b}{a}\right)^n \geq 2^{n+1}.$$

Exercice 30 : (★★)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soit $p \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2p$.

Calculer :

$$\sum_{k=0}^p \binom{n}{2k} \text{ et } \sum_{k=0}^{p-1} \binom{n}{2k+1}$$

Exercice 31 : (★★★)

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 4^n (n!)^3 < (n+1)^{3n}.$$