Programme de colles Semaine 2 du 22 septembre au 26 septembre

Cours:

- Chapitre 1 : Rudiments de logique, généralités et révisions sur les suites et les fonctions
 - I Bases des mathématiques
 - **II Quantificateurs**
 - III Généralités sur les suites et les fonctions
 - IV Logique
 - V Monotonie
 - VI Systèmes linéaires
 - VII Principe de récurrence
 - VIII Suites arithmétiques, suites géométriques, suites arithmético-géométriques
 - IX Fonctions périodiques
 - X Autres principes de récurrence
 - XI Suites récurrentes linéaires d'ordre 2
 - XII Raisonnement par analyse-synthèse
- Chapitre 2 : Etude de fonctions, fonctions logarithmes, exponentielle et puissances
 - I Continuité
 - II Dérivation
 - III Bijectivité
 - IV Fonctions logarithmes, exponentielle, puissances

Questions de cours et exercices type :

 $\mathbf{Q_1}$: Valeur de f(x+nT), $n \in \mathbb{Z}$ pour une fonction T-périodique (*ch1*, *proposition 12*)

Q₂: Croissances comparées (ch2, proposition 28)

 T_1 : Ch1, exemple 6

Montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

 T_2 : Ch1, exemple 7

Soit f une fonction continue sur [0,1] telle que $f^2 = f$. Montrer que f = 0 ou f = 1.

 T_3 : Ch1, exemple 27

Soit $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, montrer que :

$$\exists ! (g,h) \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \times \mathcal{I}(\mathbb{R}), f = g + h,$$

où $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des fonctions paires sur \mathbb{R} , $\mathcal{I}(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des fonctions impaires sur \mathbb{R} et $(g,h) \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \times \mathcal{I}(\mathbb{R})$ signifie que $g \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ et $h \in \mathcal{I}(\mathbb{R})$.

Programme de colles Semaine 2 du 22 septembre au 26 septembre

Cours:

- Chapitre 1 : Rudiments de logique, généralités et révisions sur les suites et les fonctions
 - I Bases des mathématiques
 - **II Quantificateurs**
 - III Généralités sur les suites et les fonctions
 - IV Logique
 - V Monotonie
 - VI Systèmes linéaires
 - VII Principe de récurrence
 - VIII Suites arithmétiques, suites géométriques, suites arithmético-géométriques
 - IX Fonctions périodiques
 - X Autres principes de récurrence
 - XI Suites récurrentes linéaires d'ordre 2
 - XII Raisonnement par analyse-synthèse
- Chapitre 2 : Etude de fonctions, fonctions logarithmes, exponentielle et puissances
 - I Continuité
 - II Dérivation
 - III Bijectivité
 - IV Fonctions logarithmes, exponentielle, puissances

Questions de cours et exercices type :

 $\mathbf{Q_1}$: Valeur de f(x+nT), $n \in \mathbb{Z}$ pour une fonction T-périodique (*ch1*, *proposition 12*)

Q₂: Croissances comparées (ch2, proposition 28)

 T_1 : Ch1, exemple 6

Montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

 T_2 : Ch1, exemple 7

Soit f une fonction continue sur [0,1] telle que $f^2 = f$. Montrer que f = 0 ou f = 1.

 T_3 : Ch1, exemple 27

Soit $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, montrer que :

$$\exists ! (g,h) \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \times \mathcal{I}(\mathbb{R}), f = g + h,$$

où $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des fonctions paires sur \mathbb{R} , $\mathcal{I}(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des fonctions impaires sur \mathbb{R} et $(g,h) \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \times \mathcal{I}(\mathbb{R})$ signifie que $g \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ et $h \in \mathcal{I}(\mathbb{R})$.