

Exercices du chapitre 13 :

Limites et continuité

I Limite d'une fonction en un point

Exercice 1:

Etudier les limites suivantes :

1. $\frac{x^2 + e^x}{\ln(x) + x}$ en $+\infty$,
2. $\frac{\sqrt{3x+1}-4}{x-5}$ en 5,
3. $\frac{x^2 - (a+1)x + a}{x^3 - a^3}$ en $a \in \mathbb{R}$,
4. $\frac{\ln(1+x^2)}{x}$ en 0,
5. $\frac{e^{\sin x} + x}{\sqrt{x-1}}$ en $+\infty$.

Exercice 2:

Etudier les limites suivantes :

1. $\frac{x^3 + x^2 + 5}{5x^3 - x + 2}$ en $+\infty$,
2. $\sqrt{x^2 + 2x} - x$ en $+\infty$,
3. $\frac{\tan 5x}{\sin x}$ en 0,
4. $\frac{e^{3x} + 2x + 7}{e^x + e^{-x}}$ en $+\infty$,
5. $\left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$ en $+\infty$.

Exercice 3:

Etudier les limites suivantes :

1. $\frac{x^2 + 1}{\sin^2 x}$ en 0,
2. $\frac{\sin x - \sin 5x}{\sin x + \sin 5x}$ en 0,
3. $\frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ en 0,

4. $\frac{\sin \frac{1}{x}}{e^{\frac{1}{x}} + 1}$ en 0,
5. $\frac{\sin^2 x - \sin^2 a}{x^2 - a^2}$ en $a \neq 0$.

Exercice 4: (★)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ périodique telle que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ où $a \in \mathbb{R}$. Montrer que f est constante.

Exercice 5: (★★)

On considère la fonction :

$$\begin{aligned} f: \quad \mathbb{R}^* &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{(-1)^{\lfloor 1/x \rfloor}}{x} \end{aligned}$$

Montrer que f n'admet pas de limite finie en 0.

A-t-on $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \pm\infty$?

Exercice 6:

On pose :

$$f: x \rightarrow x \lfloor \frac{1}{x} \rfloor.$$

Etudier la limite de f en :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. 0, | 4. $\frac{2}{3}$, |
| 2. 2, | |
| 3. $\frac{1}{2}$, | |
| | 5. $+\infty$. |

Exercice 7:

Calculer :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \lfloor x \rfloor}{x + \lfloor x \rfloor}$$

Exercice 8: (★)

Déterminer si elle existe, la limite en a de f fonction définie sur I où :

1. $I = \mathbb{R}^*$, $f(x) = \sin x \cos \frac{1}{x}$, $a = 0$,
2. $I = \mathbb{R}^*$, $f(x) = \cos x \sin \frac{1}{x}$, $a = 0$,
3. $I = [0, \frac{\pi}{2}[$, $f(x) = \cos x + \lfloor \tan x \rfloor$, $a = \frac{\pi}{2}$,
4. $I = [0, \pi] \setminus \{\frac{\pi}{2}\}$, $f(x) = \cos x + \lfloor \tan x \rfloor$, $a = \frac{\pi}{2}$.

II Continuité en un point



Etudier la continuité des applications définies par :

1. $f(x) = x - \lfloor x \rfloor - (x - \lfloor x \rfloor)^2,$
2. $f(x) = (-1)^{\lfloor x \rfloor} (x - \lfloor x \rfloor - \frac{1}{2}),$
3. $f(x) = \begin{cases} x \sin(\frac{1}{x}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$
4. $f(x) = \begin{cases} \frac{\exp(\operatorname{Arctan} x) - 1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$



Exercice 10 : Etudier la continuité de

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x + 2\lfloor x \rfloor - 2\sqrt{x - \lfloor x \rfloor} \end{aligned}$$

2. La fonction f suivante est-elle prolongeable par continuité en 0 ?

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^* &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto (1 + x^2)^{1/x^2} \end{aligned}$$

Exercice 11 : (★)

Déterminer si les fonctions suivantes sont prolongeables par continuité en 0 :

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. $f(x) = x \lfloor \frac{1}{x} \rfloor,$ | 4. $f(x) = (1 + x)^{1/x},$ |
| 2. $f(x) = \frac{\lfloor x \rfloor}{x},$ | 5. $f(x) = \cos(\frac{1}{x}),$ |
| 3. $f(x) = \exp(\frac{1}{x}),$ | 6. $f(x) = x \cos(\frac{1}{x}).$ |

Exercice 12 : (★)

Trouver toutes les applications $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues en 0 telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(3x) = f(x).$$

Exercice 13 : (★)

Etudier la continuité de la fonction f définie par :

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ x & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

Exercice 14 : (★★)

1. Montrer que si f et g sont continues de \mathbb{R} dans \mathbb{R} et coïncident sur \mathbb{Q} , alors $f = g$ sur \mathbb{R} .
2. Soient $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que $\forall x \in \mathbb{Q}, f(x) < g(x)$.
 - (a) Montrer que $f \leq g$.
 - (b) Montrer qu'on n'a pas nécessairement : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) < g(x)$.

III Continuité sur un intervalle



Montrer que l'équation $x^{17} = x^{11} + 1$ admet au moins une solution $x \in \mathbb{R}^+$.

Exercice 16 : (★)

Soient $f, g \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ telles que $f(0) = g(1) = 0$ et $f(1) = g(0) = 1$. Montrer que :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}^+, \exists x \in [0, 1], f(x) = \lambda g(x).$$

Exercice 17 : (★)

Soient $a < b$ et soient $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b])$ telles que $f(a) = g(b)$ et $f(b) = g(a)$. Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que :

$$f(c) = g(c).$$

Exercice 18 : (★)

Soient $a < b$ et soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b])$. Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que :

$$f(a) - 2f(c) + f(b) = 0.$$

Exercice 19 : (★)

Déterminer toutes les fonctions f continues sur \mathbb{R} telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x)^2 = f(x)$$

Exercice 20 : (★)

Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$ telle que $f(0) = f(1)$. Montrer qu'il existe $c \in [0, \frac{1}{2}]$ tel que :

$$f(c) = f\left(c + \frac{1}{2}\right).$$

Exercice 21 : (★★)

Soit $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ continue. On suppose que :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = l < 1.$$

Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}^+$ tel que :

$$f(c) = c.$$

Exercice 22 : (★★)

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ telle que $f(0) = f(1)$. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists x \in [0, 1], f\left(x + \frac{1}{n}\right) = f(x).$$

Exercice 23 : (★★)

Soient $a < b$, soient $f, g : [a, b] \rightarrow [a, b]$ des fonctions continues telles que $f \circ g = g \circ f$. Montrer qu'il existe $x_0 \in [a, b]$ tel que $f(x_0) = g(x_0)$.

Exercice 24 : (★★)

Soit f une application de l'intervalle I dans \mathbb{R} continue et injective.

Montrer que f est monotone.

Exercice 25 : (★) Soit $f \in \mathcal{C}^0([1, 3])$ telle que :

$$\forall x \in [1, 3], f\left(\frac{x+1}{3}\right) + 2f\left(\frac{x^2}{9} + 1\right) + f(2 + \sin x) = 5f(x) + 2.$$

1. Montrer qu'il existe $x_1, x_2 \in [1, 3]$ tels que :

$$\forall x \in [1, 3], f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2).$$

2. Montrer que $f(x_1) \geq -2$ et que $f(x_2) \geq -2$.

3. Que peut-on en conclure sur f ?

Exercice 26 : (★)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, bornée sur \mathbb{R} et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur \mathbb{R} . Montrer que $g \circ f$ et $f \circ g$ sont bornées sur \mathbb{R} .

Exercice 27 : (★★)

Soit $f : \mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Montrer que f admet un minimum sur \mathbb{R}^{+*} .

Exercice 28 : (★)

Soit f une fonction continue sur \mathbb{R} telle que :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a \in \mathbb{R} \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \in \mathbb{R}.$$

Montrer que f est bornée.

Exercice 29 : (★★)

Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Montrer que :

$$\sup_{x \in [a, b]} f(x) = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \text{ et } \inf_{x \in [a, b]} f(x) = \inf_{x \in [a, b]} f(x).$$

Exercice 30 : (★★)

Soient f et g deux fonctions continues de $[-1, 1]$ dans \mathbb{R} .

On définit pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $M(x) = \sup_{t \in [-1, 1]} (f(t) + xg(t))$

1. Montrer que $M : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est bien définie.

2. Montrer que :

$$\forall h > 0, \forall x \in \mathbb{R}, M(x+h) \leq M(x) + h \sup_{t \in [-1, 1]} g \quad \text{et} \quad M(x+h) \geq M(x) + h \inf_{t \in [-1, 1]} g.$$

3. Montrer qu'il existe $K \geq 0$ tel que : pour tout $(a, x) \in \mathbb{R}^2$, $|M(x) - M(a)| \leq K|x - a|$. En déduire que $M : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.

Exercice 31 : (★)

On considère la fonction suivante :

$$\begin{aligned} f : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1}. \end{aligned}$$

1. Montrer que f est bijective.

2. Déterminer :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f^{-1}(2^{-n}).$$

Exercice 32 : (★)

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right|$.

1. Comparer $f\left(\frac{1}{x}\right)$ et $f(x)$.

2. On désigne par φ la restriction de f à $]-1, 1[$. Montrer que φ est une bijection de $]-1, 1[$ dans \mathbb{R} .

3. Déterminer la fonction $\varphi^{-1} \circ f$.

Exercice 33 : (★★)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} x-1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ x+1 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}.$$

Montrer que f est bijective et discontinue en tout point de \mathbb{R} .